

**SPECIMEN
MEDICUM INAUGURALE,**

CONTINENS

**DOCTRINAM DE MORBIS CUTANEIS
SECUNDUM HIPPOCRATEM.**

AUCTORE

W. H. IDZERDA.

A

X

P

386 (91)

29903/p

A x P

SPECIMEN MEDICUM
INAUGURALE.



Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b3034766x>

49504

**SPECIMEN MEDICUM
INAUGURALE,**

CONTINENS

**DOCTRINAM DE MORBIS CUTANEIS
SECUNDUM HIPPOCRATEM,**

QUOD,

FAVENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE

RECTORIS MAGNIFICI

PETRI HOFSTEDDE DE GROOT,

in Facult. Theol. Professoris Ordinarii,

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU,

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

PRO GRADU DOCTORIS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC
PRIVILEGIIS,

IN ACADEMIA GRONINGANA,

RITE AC LEGITIME CONSEQUENDIS,

PUBLICO FACULTATIS EXAMINI OFFERT

WIGERUS HENDERICUS IDZERDA,

FRISIUS E PAGO RAUWERD.

A. D. xxviii Februarii mdcccxxxviii. Hora xii.

~~~~~

**GRONINGAE,**

Apud W. VAN BOEKEREN, Bibliopolam.

DEPARTMENT OF MEDICINE  
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE



RECEIVED 12 OCTOBER 1957

THE WELLCOMES  
181, REGENT STREET, LONDON, W.1  
ENGLAND  
TELEGRAMS: 'WELLCOME' LONDON  
TELEPHONE: 01-253 1511  
CABLES: 'WELLCOME' LONDON  
POSTAL ORDER: 'WELLCOME' LONDON  
BANK OF ENGLAND: 'WELLCOME' LONDON  
BRANCHES: LONDON, BIRMINGHAM, MANCHESTER, GLASGOW, EDINBURGH, ABERDEEN, DUNDEE, LEITH, LIVERPOOL, CARDIFF, SWANSEA, BIRMINGHAM, MANCHESTER, GLASGOW, EDINBURGH, ABERDEEN, DUNDEE, LEITH, LIVERPOOL, CARDIFF, SWANSEA



**H. R. IDZERDA,**

MED. ART. OBSTR. ET CRIRURG. PRACTICO

**PATRI OPTIMO, CARISSIMO**

NEG NON

**J. R. TIJL,**

SOCERO FUTURO

Hasce primitias auctor grato  
animo sacras facit.

ADMISSION

TO THE

LIBRARY

OF THE

UNIVERSITY

OF CALIFORNIA

## PRAEFATIO.



***D**octrina de morbis cutaneis , imprimis a recentioribus exculpta est. Quae WILLAN et BATEMAN summa cum industria elaborarunt , ea ulterioribus in arte salutari progressibus , emendata atque fundata sunt. Jam licet haec omnia plurimi aestimanda sint , negari tamen nequit , quin nunc hisce ipsis veterum doctrina de morbis cutaneis , per se jam obscura atque va-*

---

*ga, majore etiam caligine induvetur. Dolendum, cum ex veterum scriptis etiam res perplures, fertiles, colligi possint, synonymorum imprimis nomenclatura confusa, aditum admodum cohiberi. Praeterea, quid est aetas hominis, nisi memoria rerum nostrarum cum superiorum aetate contextitur?*

*Haud pauci exstiterunt Clarissimi et Doctissimi viri, qui omnem navarent operam veterum doctrinae, ut nova antiquaque conciliarentur; plures etiam hocce respectu de morbis cutaneis doctrinam non neglexerunt. At, quae praestita sunt, dispersa hic et illic, neque pauca oblivioni tradita sunt. Placuit ideo, dispersa colligere, et pro virium tenuitate inquirere in ea, quae veteribus nota fuerint. Argumentum vero id difficillimum colligendo et digerendo tandem ita increvit viresque superavit, ut, tempore jam urgente, modo partem aliquam, continentem doctrinam Hippocraticam de morbis cutaneis. ju-*

---

*dicio tuo benevolo , L. H. ! offerre cogerer.*  
*Summas gratias Vobis ago atque habeo*  
*Viri Clarissimi , quos praeceptores habui in*  
*disciplina medica. Omnem enim , quaecun-*  
*que sit doctrina , a vobis accepi , Professores*  
*Aestumatissimi ! Vestra praecepta me eo du-*  
*xerunt , ut jamjam pro viribus civitati salu-*  
*taria exhibeam. Vobis ducibus , ad finem*  
*pervenire , quem diu optavi. Neque tui hic*  
*immemor esse possum , Clarissime VAN HALL !*  
*cum tantis officiis tibi devinctum me sentio.*  
*Vivatis diu felices in Academiae gloriam.*

*Ne vos poeniteat , Reverendissime L. KIJLSTRA*  
*ac Doctissime D. KAN ! Quam , in me contu-*  
*listis institutionem egregiam ; in Academiam*  
*profectus , equidem persensi , quae vobis debeo*  
*utilia , neque hanc valedicens grata retice-*  
*bo. — Gratus etiam vestra consilia recordor ,*  
*Consultissime J. G. J. VAN WAGENINGEN ac Doc-*  
*tissime VERSCHUIR ! quae mihi ex animo prae-*  
*buiatis.*



---

*Ultimo quidem loco ad vos me converto ,  
amici ! Confidatis vero , vestram amicitiam  
vestramque familiaritatem ad ultimum mecum  
persistere. Salvete !*



# **SPECIMEN MEDICUM INAUGURALE,**

CONTINENS

## **DOCTRINAM DE MORBIS CUTANEIS SECUNDUM HIPPOCRATEM.**

---

**A**b eo tempore, quo Graeci in sapientiam inquisiverunt, plura placita condita sunt, quae postea et arti salutari mutuata sunt. Philosophi autem Medicinam, qua talem haud coluerunt, sed de omnibus rebus divinis humanisque ratiocinantes, de corpore humano etiam sermonem instituerunt sensu magis physiologico, si tali nomine mereatur haec inquisitio. Neque haec ab initio praxin artis dirigebat, cum, si de salute aut conservanda, aut restituenda, quaestio esset, viam empiricam in-

gressi sint , nisi fortuna , occasione aut traditione quid utile servaverint.

Primum Philosophi animum convertebant in tactus sensum , cum scirent vias ac rationes , quibus res externae in mentem intelligentem veniunt. In schola Italica , quam PYTHAGORAS condidit , doctrina de quatuor elementis tradebatur , et ad visum aetherem , ad auditum aërem , ad olfactum ignem , ad tactum denique terram pertinere docebatur. Neque placitum id tantum a veritate abhorret. — ALCMAEON , de quo certum est , hunc animalium cadavera dissecuisse , foetum per cutem alimenta sugere , auctor fuit. Ab EMPEDOCLE accepta est opinio : sudori ac lacrymis mixtionem esse e quatuor ignis ac terrae cum una aquae aërisque parte.

Plura hujusmodi hic et illic leguntur de doctrina cutis physiologica , quae singula , si enumerandae essent , opus nimis extenderent. Neque etiam mihi proposui colligere , quae de nonnullis morbis cutaneis , sive endemicis sive epidemicis , sive accidentalibus , ab auctoribus , artem medicam haud callentibus , obiter nobis communicata sunt ; memorabilia modo propriis locis non praetermisi.

---

Prima fundamenta artis medicae , a vera *εμπειρία* pendentia , forte in templis , magis vero , postquam ars nostra , *exoterica* facta , in scholis medicis instrueretur , conformata sunt. E celebrioribus hisce , *Cnidia* ac *Coa* schola *veri* nominis medici prodierunt. At ab initio jam , cum primordia artis colligerentur , dissensio aderat , neque haec cessabit , nisi aliquando aditus in Naturae penetralia late pateat.

Coa schola medicos efformavit , plures nomine HIPPOCRATIS insignitos , horumque scripta , cum serioris aevi auctorum tractatibus alienata , etiam hodie haud sine fructu legimus. Haec morborum historias et curationes quam accuratissime notavit , et imprimis ad morborum decursum attendens , in prognosticis felix facta est. Illi aemula schola Cnidia subtiliter morbos distinxit , de causis atque eventu parum sollicita , et victus rationem magis negligens , graviora administravit remedia. Quemadmodum Coa schola prognosin , ita diagnosin schola cnidia coluit , minori vero successu in artis emolumenta. » Dixit paulo ante , tradit GALENUS , Cnidios medicos statim per initia de morbis plus quam deceat scripsisse , ita sunt bilis morbi septem , ad hunc autem modum ac rursum in



partibus inferioribus vesicae morbi duodecim ; in iisdem quoque partibus inferioribus renum morbi quatuor , ac postea iterum vesicae morbi stranguriae tredecim , mox etiamnum deinceps tetani tres , posteaque uteri quatuor , praeterea denique tabes tres. Ad corporum enim varietates , quae multas ob causas immutabantur , respexerunt , praetermittentes affectuum identitatem perpendere , quemadmodum accurate perpendit HIPPOCRATES , ad eorum inventionem methodo usus , qua duntaxat morborum numerum invenire conceditur”(1). Fecerunt igitur Cnidii , quemadmodum plures systematici hodierni ; priores vero minus accusandi sunt , cum per inductionem nondum tam facile in veram morbi naturam penetrare potuerint. In Cnidia schola primum fuisse studium , morbos in classes distribuendi , nullo tamen jure contendendi potest (2).

---

(1) GALENUS.

(2) SPRENGEL , *Pragm. Gesch. der Arzneykunde* ed. 3. Th. I. s. 343. HIPPOCRATES , in *Libro de morbis acutis* : Varia tamen morborum singulorum genera multiplicesque illorum divisiones non ignorarunt quidam. At numeros morborum singulorum plane declarare studentes , non recte scripserunt. Neque enim quis facile numeret , si quis ex eo aegrotantium morbum aestimet , quod ab altera re qua-

Coa schola philosophica magis ratione a prae-  
missis in sequelas transiit, attamen non raro  
post hoc ergo propter hoc conclusio, minus ex-  
perientiae consentanea, facta est, quemadmo-  
dum ex ipsis scriptis hippocraticis, de eodem  
argumento agentibus, facile derivatur. Quae a  
tabulis votivis atque propriis observationibus  
Coa schola collegit placita, oracula dici meren-  
tur propter dictionis simplicitatem verborum-  
que momentum. Fragmenta haec, ex singula-  
ribus observationibus orta, conservata invenies  
in *Prorrheticorum* libro primo atque *Coaca-  
rum praenotionum* libris, aliis interspersis  
atque emendatis, dextera atque eleganti hip-  
pocraticorum experientia, aliis vero, neque ra-  
ris, manu germana ab integritate sua corrup-  
tis atque alienatis.

Familiam hippocraticam diu viguisse, pro-  
bat Historia; ex hac vero HIPPOCRATES II plu-  
rimum celebratur (3). Quisnam etiam fuerit

            
dam differat, neque eundem esse morbum reputet, nisi eo-  
dem nomine nuncupetur. Mihi autem placet ut ad omnem  
artem animum attendamus. — Ad hunc locum, quae supra  
allata sunt, GALENUS commentatus est.

(3) SPRENGEL l. l. s. 357.

ille artis nostrae fundator e gente hippocratica ,  
dicere cum Cl. ALIBERT haud dubito : » Les  
ouvrages d'Hippocrate allument l'amour de l'art  
dans tous les âmes , ils sont placés sur l'ocean  
des âges , comme le type d'une perfection ,  
qu'on veut vainement egaler " (4). — Ne vero  
credas HIPPOCRATEM anatomicum , physiologicum  
aut nosologicum ; concursio e contra symptoma-  
tum empirica , hunc efformavit summum natu-  
rae philosophum ; attamen quae de rerum Natura  
subtilitates in illius scriptis offendas , ne ipsi  
tribuas (5). Consentio Doct. DACIER dicenti :  
» HIPPOCRATE a imité dans son style la majesté  
des oracles , et il en a aussi l'obscurité , c'est à  
nous à percer cette obscurité pour l'entendre " (6).  
Id procul dubio probatum video in *Prognosti-  
corum* libro ; in hoc enim , simplici naturalique  
ordine placita illius apparent , e Prorrheticis at-  
que Coacis praenotionibus repetita saepiusque  
correcta atque emendata. Eandem egregiam

---

(4) ALIBERT , *Nosol. Nat. Consid. prélim.*

(5) GRUNERI *Analecta ad antiq. med. Demonstratur Hippocratem cadavera non dissecuisse* , Vratislaviae 1774 ,  
p. 98.

(6) DACIER , *Les ouvrages d'Hippocrate* , trad. en fr.  
Preface.



doctrinam de prognosi statuenda praesertim exposuit in Aphorismorum collectione, cui perplura etiam manu aliena adjecta sunt. Neque minorem attentionem merentur observationes in Libro de aëre, aquis et locis, de morbis epidemicis aliisque.

In genuinis HIPPOCRATIS libris nil de cutis structura anatomica illiusque natura physiologica traditum est. Quaedam de epidermidis proprietatibus leguntur in Libro de *natura pueri* (7), nec non de pilorum generatione, incremento, colore, etc.; hic vero e iudicio criticorum post HEROPHILI aetatem conscriptus est. De capillorum origine etiam disseruit auctor Libri *de carnibus* (8). Accuratius etiam de horum ortu e glandulis sebaceis locutus est, qui librum *de glandulis* composuit (9); praeterea

---

(7) HIPPOCRATES ed. F. p. 240 et 241. Ibidem et traditur: e cutis cicatricibus pilos non prodire.

(8) l. l. p. 252.

(9) l. l. p. 271. »Eoque modo reliqui corporis abundantias glandulae recipiunt et iis est alimentum accommodatum. Quare ubi uliginosae corporis partes, ibi etiam glandulae sunt. Quod hoc indicis constat, quoniam ubi

cutis utilitas finisque in Libro *de ossibus* traduntur(10). — De sudore hujusque in morbis significatione sparsim in veris HIPPOCRATIS scriptis sermo instituebatur.

Morbos cutaneos triplici respectu consideravit HIPPOCRATES, scilicet: sive sponte prodeant, sive abscessu motuque Naturae critico exoriantur, sive denique haud ita morbi, quam *foeditates* existant. — Singula huc pertinentia nunc examini submittam.

» *Λειχήνες* et *λεπραι* et *λευκαι*, si juvenibus quidem aut pueris horum aliquid contingat aut sensim se prodens, diuturnitate temporis augeatur: in iis quidem *ἐξανθήματα* haec *abscessus* (*αποστασεις*) dici nequeunt, sed *morbi*. Qui-

---

glandula, ibi etiam sunt pili. Natura siquidem glandulas et pilos creat, ambo ejusdem utilitatis gratia. Illos quidem, ut quod influit, excipiant: pilos vero, ut e glandulis, quibuscum necessarie cohaerent, producantur et augeantur, etc.”

(10) l. l. p. 277. » Ossa corpori firmitatem, rectitudinem ac formam praebent, nervi (tendines) vero flexionem, contractionem et distentionem. Carnes autem et cutis omnium colligationem ac connexionem.”

bus vero horum aliquid subito multumque accidit, id certe abscessus dici possit. Oriuntur autem λευκαι ex maxime lethalibus morbis, οἷον καὶ ἡ νουσος ἡ φθινικὴ καλεομένη. Αεπραι vero et λειχῆνες atra bile fiunt. Quae prioribus contingunt et recentissima sunt, ea facilius curantur, tum quae in summe mollibus et carnosius corporis partibus nascuntur”(11). — Ex hoc HIPPOCRATIS loco facile nunc intelligitur doctrina illius de morbis cutaneis. Supponit materiam morbosam suo pondere in aliqua parte firmari non vero excerni, qua ἀποστασις κατ’ ἀποθεσιν nascitur, vel etiam in alicujus morbi solutionem materiam morbi- ficam ad locum remotum externum excerni, qua ἀποστασις κατ’ ἐκκρισιν vel κατ’ ἐκκροην.

Λειχην procul dubio hic est *lichen* WILLANI, licet vera hujus delineatio e scriptis hippocraticis non pateat. Videtur ab HIPPOCRATE eadem classe quasi posita, ut lepra; imprimis vero postea a scriptoribus prurigo, lichen, psora et lepra una serie ponebantur, qua gradus diversi ejusdem morbi. Pertinet hic ad morbos ver-

---

(11) l. l. p. 114.



nales , dum alio in loco de febre sermo est , in qua τα λειχηνώδεα ἐξαιρομένα simul vel serius contigerant , id est , lichenes tuberosi aderant (12). Secundum CELSUM lichen graecorum papula est , quod nomen simul hujus exanthematis characterem indicat ; PLINIUS quidem hanc *impetiginem* dixit , — ne tamen commisceatur cum morbo longe diverso , quem hodierni sub hoc nomine intelligunt. Omnes etiam Auctores recentiores uti DE GORTER , FELIX FLATER illi tribuunt sic dictas *pustulas siccas* , admodum prurientes , quas certo papulas dicere possumus. ALIBERT illum nomine , *Prurigine lichenoidē* s. *furfurante* insignivit ; a WILLANO Prurigo in genus peculiare reductus est. Si nunc ad decursum hujus cutis eruptionis attendamus , qualem auctores tradunt , certo mirandum non est , hanc cum prurigine , psora et lepra una eademque serie collocatam fuisse ; pruritus enim summus , cutis asperitas quaedamque squamarum species observantur. Lichen saepius pueros afficit ; et hic ab hodiernis *strophulus* dicitur , qui apud WILLAN genus distinctum format. Eundem inter vernos morbos

---

(12) *De morb. epidem.* L. IV , 1127.

numerari posse, probat non solum observatio sed et *lichen tropicus*. Praeterea eruptio, quam saepius dixerunt perverse scabiem criticam, sive siccam, etiam lichenis species existit. LORRY jam accurate differentiam a scabie indicavit (13). — *Psydracia* J. FRANKII.

*Λεπρα*. Sequentem morbi casum legimus apud HIPPOCRATEM: Athenis quidam pruritu totius corporis praecipue tamen testium et frontis detinebatur, ac vehementer admodum vexabatur. Cutis toto corpore crassa erat, ac qualis in lepra videri solet, neque ulla ex parte prae crassitudine apprehendi poterat. Hic nullis remediis iuvare potuit. In Melum autem ad balnea calida profectus, prurigne et cutis crassitudine liberatus est, hydrope tamen periit (14). Ex hoc igitur casu leprae patet simultanea affectio capitis atque genitalium, quemadmodum etiam WILLAN tradidit (15). Etiam BATEMAN confirmat

---

(13) LORRY, *de morb. cutan.* c. III. p. 215.

(14) HIPPOCRATES, *de morb. epid.* L. V. p. 1144.

(15) *Die Hautkrankheiten und ihre Behandlung von R. WILLAN a. d. Engl. von FRIESE*, St. I. s. 62; St. II. s. 88.

observationem de pruritu incremente, cum tempestas mutetur, quae itidem in Hippocratico opere nobis conservata est (16). Hicce morbus nomen suum retinuit, cum *lepra graecorum* a WILLANO *vulgaris* dicatur, atque *lepra squamosa* FRANKII. Leporam contagiosam non esse, ex eodem loco, supra memorato, perspicuum est. Inter corporis foeditates etiam collocata est haecce cutis affectio, et hinc balnei usus laudabatur, quod usque diem in Egypto, Syria, Graecia aliisque regionibus usitatum mansit. Exitum leprae per hydropem etiam tradit J. FRANK (17). — Ne vero cum alio morbo confundatur haecce lepra, cum squamae huic characteristicae sint etiam e mente HIPPOCRATIS, qui propter peculiarem urinae conditionem furfuraceam e vesicae morbo dicit *ἐλεπρω την χυστιν* (18). — Lepra haec est ALIBERTIO *Leuces* species.

---

(16) TH. BATEMAN, *Pract. Darstellung der Hautkrankheiten* a. d. Engl. von A. HAHNEMANN u. K. SPRENGEL, s. 63. HIPPOCRATES, *De humoribus*, p. 51.

(17) J. FRANK, *Praxeos medic.* P. I. Vol. III. Sect. 2. p. 253.

(18) HIPPOCRATES, *De morb. Epidem.* L. V. p. 1146.



*Λευξη* ante pubertatem, secundum HIPPOCRATEM metuenda non est (19), nisi congenita fuerit (*μὴ συγγενῆς*). Ex hisce igitur intelligitur, Leuces originem hereditariam etiam HIPPOCRATEM cognovisse. Pertinet ad periculosissimos et difficillimos morbos (20). Hicce morbus ab albo colore, quem maculae offerunt dictus est, et convenire videtur Leprae speciei, in sacra scriptura indicatae. Ab Arabibus ea cum elephantiasi sub Leprae nomine comprehendebatur. A GELSO hicce morbus commiscebatur cum quadam Vitiliginis specie alba, cum propriis verbis jam naturam alienam probet. Facile tamen talis error committitur, cum primo morbi stadio solummodo maculae albae conspiciantur.

Est igitur *Λευξη* Graecorum *Zaragnat* Hebraeorum atque *Bharasch* Arabum, quam Latino-barbari *Morphoeam* dixerunt. FRANK hanc *Lepram albam* nuncupavit; dein ALIBERT eandem sub nomine *Leucae vulgaris* sive *albae* descripsit. — AESCHINES hunc morbum memorat in Insula Delo epidemicum; quod patere videtur

---

(19) L. L. *Coacae praenot.* p. 201.

(20) L. L. *Prorrhēt.* L. p. 424.

ex descriptione , quae legitur in illius (21) epistola ad Philocratem.

Loco *νοσος φοινικιν* legendum esse *φοινικιν* non solum patet ex sensu loci allati , sed etiam exegesi GALENI probatur , adeo ut hic sermo fiat de *morbo phoeniceo* , quem idem auctor *Elephantiasin* habet. Multa disputata sunt hac de re , cum apud Graecos senioris aevi occurrat hujus morbi insignis delineatio , uti apud ARETAEUM, ARCHIGENEM, qui eum summa cum diligentia descripserunt. Elephantiasis nomen quidem HIPPOCRATI cognitum esse non poterat , quia hoc a convenientia quadam cum elephanti dermate deductum sit, et haecce animalia , eo florente , nondum innotuissent Graecis. PAUSANIAS narrat *Alexandrum* primum in bello contra Porum elephantos vidisse. Attamen non obstat , quin morbus hic Medicinae patri notus fuerit , cum , uti LUCRETIVS cecinit :

---

(21) DEMOSTHENIS et AESCHINIS op. ed. Genev. 1607 , p. 125. *Αηλιοι δε ενοσουν λοιμωδη τια νοσον. τα μεν προσωπα επιμπλαντιο λευκης και τας τριχας λευκοι εγινοντο , οδε τραχηλας αυτων και τα οτερηα ανωθεν , πυρετοι δε ουκ εγγινοντο κ. τ. λ.* Causa tribuebatur Apollini irato , cum , contra veterum morem , hominem sepulirent.

Est elephas morbus, qui, propter flumina Nili  
Gignitur, Aegypto in media, neque praeterea usquam (22).

Fuit igitur Elephantiasis morbus ab antiquis-  
simis temporibus in India Orientali, Phoenicia  
et Aegypto endemicus. Sive nunc morbus no-  
men duxit a Phoenicia, uti hodie solemus di-  
cere morbum gallicum pro syphilide, sive a  
colore phoeniceo aegritudinis, contendere pos-  
sumus contra HENSLER (23) per phoeniceum mor-  
bum elephantiasin intelligendae ille, quam recen-  
tiores et Graecam dicunt eamque ab Arabica distin-  
guunt, licet tum temporis hic morbus in Grae-  
cia nimis cognitus fuisse videatur. — Forte  
sub alio nomine reperiiebatur. ARISTOTELES  
enim loquitur de morbo, faciei formam satyri  
impertiente *Σατυρία* (24); aliis auctoribus mor-  
bus hic *satyriasis* dictus fuit, ut e GALENO et  
ARETAEO perspicuum fit, qui simul nominis  
rationem dederunt. — Fuerunt, qui morbum  
phoeniceum haberent *morbillos*; id vero negans,

---

(22) LUCRETIVS, *De rerum natura*. L. VI. v. 1113.

(23) *Vom abendländ. Aussatz im Mittelalter, nebst  
einem Beitrag zur Kenntniss und Geschichte des Aus-  
satzes*. Hamburg 1790, s. 201.

(24) ARISTOTELES, *Histor. Anim.* L. IV. p. 676.



WEDEL probare conatus est, per hunc intelligi *purpuram*, cum haec ex gravissimis morbis oriatur, atque febres typhosas pestimque comitetur, quippe HIPPOCRATES loco citato hujus originem a summe lethali morbo petit (25).

Ἐξανθήματα hic sensu generali sumenda sunt. Animadvertit etiam FOËSIUS in vocem, » ἔξανθήματα dicuntur HIPPOCRATI pustulae aut papulae et leves in cutem eruptiones, sive in ea extuberent sive eam non excedant sed tantum exasperent.” Male igitur hic FOËSIUS *pustulas* vertit, cum minime talis eruptio hic intelligi possit. Multiplici sensu hac voce usum fuisse HIPPOCRATEM e sequentibus patebit:

» In febre, cum corporis jactura incipiens (ἄσωδеси) et alvi turbulenta suppressione celeriter velut culicum puncturae in cutem erumpunt (ἔξανθισματα οἷα κωνώπων κεντήματα) et ad oculos lacrymosus abscessus procedit” (26). Nar-

---

(25) WEDEL, *Diss. de morbo phoeniceo Hippocratis*. Jen. 1702.

(26) HIPPOCRATES *Coac. praenot.* p. 208. Ἄσωδеси addidi πυρετοῦ in locum hunc obscurum intelligendum, quemadmodum etiam alibi occurrit e. gr. in Libro II. de morb. vulg. p. 1020, ubi etiam febris in Perintho epi-

rat auctor : Euphranaoris filio τα ἐξανθηματα οἷα τῶν πωνόπων δηγματα accidisse et paulo post febrem invasisse (27).

Ad vigesimum quintum febris biliosi nervosi diem exorta sunt ἐξανθηματα δι' ολιγου κνησμοδεα θερμα, ὥσπερ πυρικαυστα (28).

Timonactis infanti fere bimestri ἐξανθηματα in cruribus, coxis, lumbis, et hypogastrio et tumores valde rubri exorta sunt. His sedatis, convulsionibus periit (29).

Capitis dolores, quae absque ulla causa visibili continuant, imprimis cessant si abcessus oriuntur, aut haemorrhoides aut ἐξανθηματα

demicae mentio fit, aestate saevientis, quibus circa septimum, octavum ac nonum diem, asperitates quaedam miliaecae, culicum morsuum fere similes, quae tamen non admodum pruriebant, in cute nascebantur et ad iudicationem usque perdurabant; ac ne eae quidem masculorum ulli eruperunt. Εγενοντο τε ἐν τοῖσι θερινοῖσι πυρετοῖσι περιζ' καὶ ἡ καὶ θ' τρηχυσματα ἐν τῷ χρώτι κεγχρωδεα, τοῖσιν πο καωνόπων γινομενοῖς μαλιστα ἵκελα ἀναδηγμασιν, οὐ πανν κνησμοδεα ταῦτα διετελεῖ μεχρὶ κρισίος. ἄρσενι δὲ οὐδενι εἶδον τοιαυτα ἐξανθήσανται.

(27) l. l. *de morb. vulg.* L. VII. p. 1235. In Phrenitico quodam l. l. p. 1229; in febre nervosa l. l. p. 1230. Casus supra memoratus repetitur in L. V p. 1161.

(28) l. l. L. VII. p. 1221.

(29) l. l. L. VII. p. 1238.

ἐν τοῖς σώμασι. Λυσιτελεῖ δὲ καὶ πιτυρωθεῖσα ἡ κεφαλή (30).

Τὰ πλατέα ἐξανθηματα οὐ παννυτι κνησμοδεα i. e. exanthemata lata, raro prurigino-sa (31).

Sileno febre gravissima nervosa laboranti, ex laboribus, computationibus et exercitationibus intempestivis, octavo die sudor frigidus erupit, nec non ἐξανθηματα μετὰ ἰδρωτας ἐρυθρά, στρογγυλὰ, μικρὰ οἷτε ἰόνθοι, eaque permanebant nec abscessum faciebant (32).

Pluribus locis verbo ἐξανθεῖν utuntur Graeci ad quandam cutis eruptionem significandam. Eadem significatione etiam occurrit vox ἐξανθισματα:

» Quibus salsa sputa cum tussi subsistunt, iis corpus exanthematibus rubescit, ante obitum vero exasperatur (ερυθαινεταὶ οἷτε ἐξανθισματα)» (33).

(30) l. l. *Prognost.* L. II. p. 109.

(31) l. l. *Aph.* 9. Sect. VI. p. 1256. Convenit cum hocce aphorismo observatio de Simone in *aph.* 22. Sect. II. *Libr.* VI. *Epid.* p. 1170.

(32) l. l. *de morb. vulg.* L. I. p. 970.

(33) l. l. *Coac. praenot.* p. 157.



» Τα ἀμυχώδεα ἐξανθίσματα , φθισιν ἐξίως σημαίνει » (34).

Quod nunc ad diversarum eruptionum explicationem attinet, brevis esse possum. Evidens enim est HIPPOCRATEM per exanthemata culicum morsui similia, febrem aliosque morbos concomitantia intellexisse, quae hodierni dicunt *petechias symptomáticas*, s. *purpuram contagiosam* WILLANI. Praeterea exempla hic exstant febris, cui *miliaria* accedebant, imprimis in Epidemia Perinthis critica; etiam aliis in locis mentionem fecit HIPPOCRATES miliarium sub sudore erumpentium: ἰδρῶτες κεγχροειδέες. Per nonnulla exanthemata hic *Erythema* indicatur, atque imprimis τα ἀμυχώδεα ad excoriationes sive *intertriginem* respiciunt, quae cachecticis tabeque laborantibus haud raro superveniunt.

Ex loco igitur supra allato patet doctrina HIPPOCRATIS de lichene, lepra et leuce; duae priores ab atra bile originem petunt, dum posterior ex affectione magis virulenta nascitur, uti et elephantiasis Graecorum. Simul indicat, multum interesse, num morbi hi primarii effor-

---

(34) l. l. p. 189.

mentur, quando apud juniores facilius curantur, an vero sint abscessus, vel critica ratione eruperint, credens exanthemata parva ad alicujus morbi solutionem non sufficere (35).

Jam vero locus de morborum per cutem solutione amplior exstat (36): » Quin etiam quae exterius in cutem abscedunt *φυματα*, *οἷτε ταγγαι και τα ἐκπνουντα*, aut *ἔλκος*, aut reliquae hujus generis eruptiones cutaneae, desquamations (*λοποι*), *μαδισις*, *ἀλφος*, lepra aliaque hujusmodi, quae conferto et repenti quodam confluxu, non autem dimidiate et semirepente abscedunt, et quaecunque alia dicta sunt, etsi non indigne morbi mutationi. Ita Tamenei nepti ex valido morbo quiddam in digitum firmatum est, qui, cum morbo suscipiendo non esset, ex interno recursu obiit.”

*Φῦματα* latiori sensu dicuntur omnes tumores, sponte geniti, atque in suppurationem vergentes. Habebantur interdum inter

---

(35) HIPPOCRATES l. l. p. 946.

(36) l. l. p. 1002.

excretiones secundum naturam (37), abscessus critici in febribus (38), glandularum intumescantiae uti *τα χοιρωδεα φυματα* (39). Etiam pulmonum tubercula eodem sub nomine describuntur (40). Hoc in loco sermo fit de hisce tumoribus sensu latiori, sive in putrescentiam (*ταγγαι*) sive in suppurationem (*εκπυουντα*) abeant. J. FRANK sub *urticationis* nomine describit eruptionem cutaneam, sub triplici forma prodeuntem. Ea, quae tubercula alta, dura, basi inaequalia exhibet, constitueret *morbum tuberculosum*, *φῦμα* Graecorum. *Erythema nodosum* et *tuberculosum* BATEMANI esset hujus varietas. *Urticatio* ab omni parte distinguitur a sic dicta *urticaria*.

*Λοποι* (a *λεπω*) desquamations epidermidis existunt; in libro de Arte: extrema cutis facies, epidermis nobis, *λοπος* dicitur.

---

(37) L. de alimento, p. 581.

(38) Aph. 44 et 45. Sect. IV. et aph. 65 et 66. L. VII; L. VI. de morh. vulg. p. 1176, p. 1165.

(39) Aph. 26, Sect. III; Prorrh. L. p. 95. Porro Aph. 8. S. VII; Epidem. L. VI. p. 1200. de suppurantibus tumoribus.

(40) *Coac. praenot.* p. 103; Lib. de art. p. 612 etc. Cf. *Oeconomia* FÖESII in voce.



‘*Ελκος* sensu generaliori itidem obvium est, uti et apud HOMERUM, de quacunque solutione continui, excepta ossea, sive ab externa, sive ab interna procedat laesione. Praeterea peculiaris cutis eruptio sub hoc nomine intellexisse videtur HIPPOCRATES; numerantur enim inter morbos vernos *ἐξανθησεις ἐλκώδεις* (41); etiam infantibus a pituitoso orirentur humore ad caput, aures et reliquum corpus tendente (42). Videntur ita indicari, quaedam species herpetis, eczematidis, impetiginis vel porriginis, licet diversa sit horum forma elementaris.

*Μαδισις* dicitur de capillorum defluvio.

‘*Αλφος* ab omni parte apud HIPPOCRATEM distinguitur a Leuce et Lepra, quacum ab auctoribus serioris aevi commiscebatur. Cum ab *ἀλφαινέω immuto*, derivetur, jure habetur *άλφος* simplex cutis decoloratio, absque asperitate, squamis et exulceratione. Etiam Arabes

---

(41) Aph. 20. Sect. III. p. 1248. parte distinguitur a sic dicta *urticaria*.

(42) Lib. de sacro morbo p. 304: *καὶ ὁκοοῖσιν μὲν παιδιοῖσιν ἐοῦσιν ἐξανθεῖν ἔλκεα, εἰς τὴν κεφαλὴν, καὶ εἰς τὰ ὄνατα, καὶ εἰς τὸ ἄλλον χρῶτα* etc.



postea Alphum, *Albohak* dicentes, a Leuce et Elephantiasi, sub leprae nomine complexis, distinxerunt. Fuit etiam Graecis senioris aevi affectio levior. Descriptio, quam CELSUS sub eodem nomine tradit, convenit *Leprae alphoidae* WILLANI: *Alphos vocatur, ubi color albus est, fere subasper et non continuus, ut quaedam, quasi guttae dispersae videantur. Interdum etiam latius, et cum quibusdam intermissionibus serpit* (43). ALIBERT Alpho aliam tribuit naturam, benignam magis, eumque *Achroma vitiliginem* appellat. Etiam FRANKIO est *vitiligo alba*.

Quod evidens est, HIPPOCRATES non ita egit de cutis eruptionibus sensu nosographico, quam sensu prognostico, quo cognoscatur morborum per hasce solutio etc. Quod non solum e spuriiis HIPPOCRATICIS operibus, sed etiam e quam maxime genuinis colligitur. Repeto sequentia:

» Quibus per febres assiduas *φλυζακία* toto corpore enascuntur, lethale est, nisi quid pu-

---

(43) CELSUS *De medicina*, L. V. c. 28.

rulentum abscedat. In his vero praecipue ad aures tumores nasci solent ” (44).

» Empyemate laborantibus , cum ad articulos *φλυκταιναι* praerubrae superficiales enatae sunt, ac dein rigent , iis velut ex acceptis plagis cum dolore venter et inguina rubescunt et intereunt ” (45).

Etiam ubi de capitis dolentis per cutis eruptiones solutione locutus est HIPPOCRATES , idem dicit inter alia : juvat etiam *πιτυρωθειςα ή κεφαλη*. Quibus vero per caput *ναρκαι και κνιδωσιες* , interdum per totum , interdum in aliqua parte percurrunt , saepius vero frigoris alicujus sensus caput pervagari videtur , ab iis sciscitari oportet , num etiam ad summam linguam pungens ille pruritus pertingat. Sic enim magnus morbus est , et qui aegre solvatur ; alioquin vero facilis (46).

*Φλυζακια* , *φλυκταιναι* ab antiquis jam aliquomodo distinctae a se invicem fuisse videntur. *φλυζακια* autem GALENUS in exegesi dixit *ψυδρακια*. In genere vero haec ipsi HIPPOCRATI

---

(44) HIPPOCRATES *Coac. praenot.* p. 133. Consimiliter :  
 ” *Εν πυρετοις συνεχεσι φλυζακια κατα παν το σωμα εκφυει.*

(45) l. l. p. 195.

(46) l. *Prognost.* p. 109.

non adeo diversa erant. *φλυξαια*, *απο του φλυζειν* bullas, quales igne excitantur, significant; *φλυκταιναι* vero a scriptoribus serioris aevi magis dicebantur pustularum genera, propter saniem tenuem, cutem erodentem et pungentem, quam retinent. Attamen et *φλυκταιναι*, procul dubio ab ita dictis *φλυκταις* non distinguendae, de bullis valent, quales ab igne provocantur (47). — Inter symptomata febris hecticae, quae vomicam pulmonalem comitantur, etiam ab HIPPOCRATE *φλυκταινιδις* recensentur (48), quae alio loco dicuntur *ὥσπερ πυριγκανστοι δίανισταντο* (49). Phlyctaenae lividae (*υποπελιοι*) accedebant filiae Aristophontis sub difficili judicatione morbi (50). — Ex omnibus collatis patet, nulla ratione e HIPPOCRATE

---

(47) L. de humoribus. p. 47; De morb. mul. p. 673.  
*αἱ ἀπο καυμάτων ἐπεγεγομεναι φλυκταις.*

(48) Coacae praenot. p. 183.

(49) Epidem. morb. L. II. p. 994: »Cranone carbunculi aestate grassabantur (*αιθρακες*). Per magnos aestus affatim et continenter compluit, idque austro magis. Sanies quidem plurima cuti subnascebatur, quae intro conclusa, dum incalesceret, pruriginem excitabat. Deinde vero in *φλυκταινιδες* erumpebant, iis affines, quae in combustis fieri solent. Tantus inerat sub cute ardoris sensus, ut uri viderentur.»

(50) L. de morb. vulg. IV. p. 1129.



derivari posse, illi certam fuisse notionem de phlysaciis aut phlyctaenis, quae imprimis WILLAN quam accuratissime delineavit. Mirum igitur non est, varios auctores varias fecisse hypotheses de natura eruptionis cutaneae, quae proponi posuissent tali sub nomine. Imprimis, cum omnes fere febris comites sint, crediderunt, varia exanthemata ita indicata fuisse, quae ab hodiernis variolae, aut morbilli dicantur. BATEMAN *φλυζακία* supra commemorata variolas habet, attamen pro hacce thesi argumenta non tradit (51). Quantum autem desudarint auctores in eruenda prima variolarum cognitione, luculenter e litteratura, a Cl. J. FRANK collecta, apparet, qui simul varia loca ex HIPPOCRATE, atque ex aliis scriptoribus, notat, huc spectantia (52). » Istorum autem inquit, amplectimur opinionem (scilicet originem ab Arabibus petentium): si enim antiqui variolas cognovissent, eas sane instar reliquorum morborum adeo clare descripsissent, ut modo disceptationibus locus minime foret. Constat

---

(51) BATEMAN l. c. p. 110. THUCYDIDES, pestem Atticam describens, inter hujus symptomata etiam monet *φλυκταιναι*.

(52) FRANK l. l. p. 179. not. 4.



praeterea quodvis aevum suos cognoscere morbos, et hodiernum adhuc exstare regiones, in quas variolae haud dudum irruere.” Minus autem ab HIPPOCRATE cutaneae eruptionis quaedam descriptio expectari potuit, cum has, imprimis febribus accedentes, aut criticas aut symptomaticas habuit. Locus hic quidem hypothesis determinandus non est; plura vero contra, quam pro argumento adduci possunt. — Peculiare genus constituit FRANK sub nomine *psydracii*, et ALIBERT genus sub nomine *Olophlyctidis* retinuit, *hydroam* et *sudamina* comprehendens, atque aliud sub *Phlyzacii* nomine describens.

*Πιτυρίασις* hic intelligitur capitis morbus, qui etiam ab hodiernis ita appellatus est. FRANK hanc ad *Porriginis* speciem retulit; attamen non commiscenda est cum *porrigine* CELSI, qui eundem locum tradit (53). Concedere nequeo BATEMANO, qui etiam pityriasin *porriginem* dixit, cum *πιτυρον* furfur vertitur. Eadem observatio ab omnibus fere medicis comprobatur. Casus hujusmodi etiam

---

(53) Loquitur et HIPPOCRATES de eodem in L. de morb. Epid. IV. p. 1121, ut symptomate febris hyemalis.

mihi amica manu communicata est : Juvenis , ceteroquin omni respectu sanus , per plures annos , inde a decimo quinto aetatis suae anno , quaque aestate capitis dolore vexabatur. Hic plurimum epistaxi spontanea , interdum vero , cum gravior exstiterit , venae sectione aut hirudinibus levabatur. Doloris causa evidenter a sanguinea congestione pendebat ; ceteroquin vero sub integra sanitate , plethorica haecce conditio solum a haematosi nimis vegeta derivari potuit. Per aliquod tempus diarrhoea accedebat spontanea ex abnormali affectione nulla derivanda , neque ab usu remediorum , cum nulla administrata fuerint ; diu hac ratione cephalea sublata est. Postea lente effloruit capitis affectio furfuracea , pityriasis , atque rarissime caput illi dolebat.

*Κνιδωσις* secundum etymologiam urentem indicat pruritum , qualis ab urticis excitatur , adeo ut per hanc cutis eruptionem intelligenda sit sive *pruriginis* , sive *urticariae* species. Hoc nomen et retinuit ALIBERT ad eundem morbum indicandum. Hic species horum morborum chronicae interpretandae sunt.

HIPPOCRATES, qui in universum ad aetates annique tempora tanta cum industria attendebat, neque minus neglexit eruptiones cutaneas hac ratione considerare. Sic inter vernaes morbos citat: Lepram, Lichenes, Alphum, *ἐξανθησιες ἐλκωδες* et phymata (54); inter aestivas: oris exulcerationes (*ἐλκωσιες*) et *ιδρωα* (55).

Per aetates haec eveniunt: parvis ac recens natis, aphthae (56); aetate progressis, *ἀκροχορδονες*, *σατυριασμοι*, *χοιραδες* et alia phymata (57); senibus tandem *ξυσμοι του σωματος ολου* (58).

Consimilis locus in libro *Praedictorum* II exstat. Docet ibidem auctor ad cognoscenda ulcera in considerationem ducenda esse, hominum naturas, loca affecta, et colores. »Quod ad aetates autem attinet, tumores suppurantes oriuntur, et ut plurimum *φυματα χοιρωδεα* apud infantes; minus ac

---

(54) Aph. 20. Sect. III. p. 1248. *ἐξανθησιες ἐλκωδες* videntur ad Impetiginis species pertinere.

(55) l. l. Aph. 24.

(56) l. l. Aph. 26. Cf. p. 202, 205 et 206.

(57) l. l. Aph. 31.

(58) l. c. p. 95.



difficilius haec nascuntur, cum aetate processe-  
rint; viris autem id genus tumorum non ad-  
modum fiunt, vero *κηρια δεινα; κρυπτοι καν-  
κρῖνοι οι υποβρυχιοι, καὶ οἱ ἐκ των ἐπινυ-  
κτιδων ἐρπητες*, donec sexagesimum annum  
superaverint. Senibus vero ex hujusmodi tu-  
morum nullus fit.”

*Ἰδρωα* sunt sudamina, quae sub eodem no-  
mine a J. PRANK describuntur. WILLAN haec  
interdum miliaria fuisse asserit, interdum vero  
constituisse sic dictam eruptionem: *Summer-  
rash* vel *Prickley-heat* a Doct. CLAGHORN de-  
scriptam (59). ALIBERT haec *Olophlyctidi hy-  
droïcae* adjunxit.

*Ἀκροχορδωνες* Latinis dicuntur *verrucae pen-  
siles*, sunt, uti GORRAEUS dicit, eminentiae do-  
lentes, callosae, teretes, infra tenuiores etc.  
Differunt *απο ταις μυρμηκιας*, quae formicae  
mordentis sensum inducerent, basi lata et nigro  
colore, eaque ablatae sanguinem fundunt. De-  
scribitur *verruca acrochordon* ab ALIBERT. RA-  
YER monet s. d. *verrues pediculées*.

---

(59) WILLAN. l. c. p. 42 et 43.



*Σατυριασμοι* oblongi glandularum pone aures tumores, sic nuncupati a convenientia cum satyrorum effigie. Ne vero cum Elephantiasi confundatur, quam interdum seriores scriptores eodem nomine insigniebant.

*Χοιραδες* dicuntur omnes glandularum tumores, quos hodie scrophulosi tribuimus, eosque FOESIUS, CELSUM secutus, *strumas* vertit. Quia eadem affectio porcis esset familiaris, hoc nomen accepit.

*Ξυσμος* etiam aliis in locis *κνησμος* dicitur. Est haecce affectio hoc in loco *prurigo senilis* WILLANI.

*Κηριον* morbus est, qui ad favorum similitudinem ulcera constituit, cutem multis foraminibus perrodens, ex quibus humor mellis similis effunditur. Hinc idem morbus Latinis *favus* dicebatur. Est igitur *Porrigo lupinosa* WILLANI, s. *favosa* BIETT. RAYER peculiare genus sub *Favi* nomine describit.

*Κρυπτοι κανκρινοι* sunt affectiones cancro-sae in organis internis; etiam ita dictae sunt,

quae exterius conspiciuntur, non vero exulceratae offenduntur. Graeci senioris aevi hisce vocibus peculiaribus insigunt cancrum uteri affectionem(60). Familia tertia ALIBERTI continet *dermatoses cancras* atque *καρκινος* sive carcinus genus primum constituit. — *Κανκρινος* et *καρκινωμα* synonyma sunt in opere Hippocratico. Statuit HIPPOCRATES hunc morbum ante pubertatem non orientem, nisi congenitus fuerit(61).

*Επινυκτιδες*, pustulae lividae, ut PLINIUS docet, nocte inquietantes. Auctore RAYER, fuit peculiaris endemicus Graeciae morbus, et huius mentionem fecit inter, ut propriis illius verbis utar: *maladies disparues*. Apud CELSUM imprimis accuratissima exstat huius morbi descriptio, e qua et illustratur ulcerum origo, de

---

(60) » Quibus cancri occulti oriuntur, eos non curare praestat. Curati namque cito pereunt, non curati vero diutius perdurant.” Aph. 38. L. VI. Luculentur haec dicta sunt de *cancere occulto*, qualis et hodie dicitur, qui sub applicatione remediorum, praesertim externorum, exulceratur, atque per hanc viam aegri vitam eo citius extinguit.

(61) Coac. praenot. p. 291.

De Carcinomate pectoris Epid. L. V. p. 1162; in faucibus l. l. p. 1238; in utero, de Nat. mul. L. p. 570.

quibus HIPPOCRATES loquitur (62). Multa de genere *Epinyctide* apud ALIBERT reperiuntur. — Olim crediderunt Epinyctidem esse *Urticariam tuberosam*. Attamen ab hac longe diversa est haecce cutis affectio. Probabilior apparet SPRENGELII opinio, epinyctidem fuisse herpetis speciem (63), nocte imprimis, etiam verno tempore vel aestate prodeuntem. Hujusmodi naturae etiam est sic dicta *Mal. de la Rose Asturien*.

Sub curatione morbi cutanei ad corpus univ-  
ersum attendendum esse, monet HIPPOCRATES,  
dicens v. gr.: » Cum fauces aegrotant aut phy-  
» mata in corpore oriuntur, secretiones in con-  
» siderationem habendae (64). Si namque bilio-  
» sae sint, corpus aegrotat; at si sanorum simi-  
» les exstiterint, secure corpus nutrias.”

Multa egregia etiam tradita sunt in libro,  
qui de aëre, aquis et locis agit. Recenset ibi-  
dem epinyctidem, *φαγεδαίνας* propter aesta-  
tem humidam etc. (65). — *Phagedaena* est ul-

---

(62) De morbis intern. p. 560.

(63) BATEMAN l. c. p. 162 not.

(64) Aph. 15. Sect. II. p. 1144.

(65) L. de aëre, aq. et loc. p. 281.



cus exedens, quod saepius in libris Hippocraticis offenditur (66), *Herpes exedens* a KRAUS, ab aliis *Lupus* vocatur, dum ab ALIBERT inter *Esthiomeni* genus recensetur. — Neque omitendum est, HIPPOCRATEM etiam ex forma eruptionis cutaneae prognosin constituisse (67).

Antiqua et scholae hippocraticae propria doctrina de quatuor humoribus in Libro de *Affectionibus*, Medicinae Patri haud indigno, exponitur. Ibidem et de morborum cutaneorum origine sequentia prostant: Lepra, prurigo, ψώρα, lichenes, alphas, alopecia a pituita oriuntur. *Εστι δὲ τὰ τοιαῦτα αἰσχρός μαλλον ἢ νοσήματα*; favus, scrophulosis, φυγεθλας και δοθιῆνες, και ανθραι, απο φλεγματος φνεται (68).

De natura vero incerta eruptionum catanearum auctor alius sic disserit: ulcus, ἔσχαρη, sanguis, pus, sanies, lepra, furfur, ἄχωρ, lichen, alphas,

---

(66) Cf. *Oeconomia* FOËSI in voce.

(67) Aph. 4 et 9. Sect. VI. Libr. VI. *Epidem.* p. 1070.

(68) *De affect.* Sect. V. p. 525.



ἐφηλῖς, interdum quidem laedunt, interdum vero juvant, est ubi neque laedunt, neque juvant (69). — » Fluxum haemorrhoidalem juvare a phagedaenis, δοθιῆσιν vel τέρμινθοιςιν, forte a lepra, multisque aliis hujusmodi. Intempestive tamen curati multi, brevi hujusmodi morbis correpti sunt, eamque ob causam perniciosi habuerunt (70).” — Excretionibus secundum naturam annumerantur: Θυμὸν, lepra, tumores, et cancer.

Ψώρα perverse cum *scabie* recentiorum confunditur. Nullibi apud Graecos accurata hujus morbi descriptio offenditur. Cum a Graecis duae species indicentur ψώρα ἐλκωδὲς et ψώρα λερωδὲς, priorem retulit RAYER ad *impetiginem*, alteram ad *psoriasin*, vestigia WILLANI atque BATEMANI secutus. Ceteroquin ex opusculis HIPPOCRATES certiores hoc de morbo fieri non possumus. Locutus quidem est de palpebrarum et vesicae urinariae psora, eo forte sensu, quo intelligatur earum partium erosio cum

---

69) *De alimento* p. 381; ἐσχαρῇ est ulcerum crusta, qualis caustico vel ferro candenti producitur.

(70) *Epidem.* L. VI. p. 1176. *L. de humor.* p. 56.

pruritu secundum originem etymologicam vocis.

*Φυγεθλα* per *panum* ob similitudinem vertunt, secundum CELSUM, qui hunc accurate descripsit. Secundum PAULUM AEGINETAM esset, explicante GORRAEO, *Erysipelas phlegmonodes*. ALIBERT furunculi speciem *panulatam* descripsit.

*Δοθιεν* est *furunculus*, tumor αποστεματωδης. Distinguitur απο του τερμινθου. Latinis est *Terebinthus* ob similitudinem cum hujus arboris fructu. Est furunculi vel phymatis species. Mimine concedendum est cl. ALIBERT, qui hunc *Mycosin Fungoidem* habet; quippe haec originem syphiliticam habet. Sunt terminthi excrescentiae nigro-viridescentes, quae secundum HIPPOCRATEM praesertim ad crura oriuntur (71). WILLAN terminthum posuit in ordinis: *Tuberculorum* genere *phymate*.

*Ἀνοραξ* morbus est indeterminatus in operibus Hippocraticis. Non improbabile mihi vi-

---

(71) De morb. vulg. L. II. p. 1012.

detur ea voce *anthracum* intelligi, qualem RAYER descripsit a *carbunculo* longe diversum. *Carbunculus* CELSI apud RAYER sub nomine *pustulae malignae* offenditur. Anthrax hicce benignus est forte *Furunculus vesparyus* ALIBERT. — Ceteroquin ex aliis locis per anthracem verum carbunculum intelligi, non opus est, ut moneam (72).

*Ἀχῶρ* est *crusta lactea*, potius *porriginis* species WILLANI. Peculiare genus ALIBERT sub hoc nomine constituit. Secundum CELSUM non multum a *favo* differret. Secundum BIETT est *impetigo larvalis* vel *granulata*.

*Ἐφελίς*, eruptio, qualis a solis influxu producitur; etiam accideret lenteria laborantibus (73), et faeminis gravidis (74), diversos colores exhibens. Hodiernis consimile macularum genus *ephelis* dicitur. Eadem a FRANK

---

(72) De *morb. Epid.* L. I. p. 97; L. II. p. 994; L. IV. p. 1029.

(73) *Prognost.* L. II. p. 103. παντοία χρώματα έχουσα.

(74) *L. achis*, quae uterum non gerunt. p. 677.

*L. de morb. mul.* L. II. p. 667. amygdreae amarae in curationem laudantur.



sub *Lentiginis* nomine describitur. *Ephelis* ab ALIBERT *pannus* dicitur. A recentioribus WILLAN, aliisque: *Chloasmus*, *pityriasis versicolor* etc.

*Θυμος* sic dictus, qui thymi corymbum referret parumque differret a *συζω*. Aliis *Θυμιον* appellabatur. Audit FRANKIO *verruca carnea* s. *mollusca*, BATEMANO *molluscum pendulum*. RAYER thymum parum a condylomate diversum habet, et inter syphiliticos morbos ponit (75).

Ex hucusque explicatis nunc patet, frustra apud HIPPOCRATEM morborum cutaneorum descriptionem quaeri, eoque minus systematicam quamdam dispositionem. Plures tamen sub eodem generico nomine, cum ad visum externum convenirent, comprehensae erant cutaneae eruptiones. Nomina ut plurimum derivata sunt, sive a natura ipsa, sive a forma

---

(75) Excrescentiae, quae a fici similitudine acceperunt (*συνα*) oculis adnascebantur atque visum obscurum reddiderunt. Recensetur inter sequelas epidemiae (*De Epid.* III. p. 1085) febris ardentis et phrenitidis, aphthae, phymata. bubones, anthraces, ecthymata et herpes.



externa , sive a similitudine cum aliqua re externa.

Exceptis iis , qui e diversis citatis locis apparent morbi cutanei , alii etiam reperiuntur in operum Hippocraticorum collectione , quemadmodum *Erysipelas* (76) ; *Erythemata* ad nares , genas , collum , qua symptomata prognostica vel diagnostica febribus , diarrhoeis , haemorrhagiae ; ἐρυθηματὰ ὑποπλατεᾶ in peripneumonia , etc (77). Duplicem indicant conditionem ἐρυθηματὰ HIPPOCRATIS , sive simplicem ruborem , sive morbum erysipelati valde affinem. Recensentur porro *Eczema* , *Ecthyma* (78) et *Excoriationes*

---

(76) L. de prisca med. S. I. p. 16 ; Praenot. L. p. 45 etc. ; Erysipelas gangraenosum Aph. 20 S. VII. etc.

(77) Coac. praenat. N. 126 , 138 , 185 , 315 , et 231 ; Epidem. L. I. p. 991 etc. Cf. *Oeconomia* FOËSII in voce. SPRENGEL apud BATEMAN p. 194.

(78) Ecthyma secundum vocis ἐκθυλατος etymologicam originem parum ab exanthematibus diversa haberi possunt. » Lactanti ἐκθυλατὰ per totum corpus erupuerunt , quae » ad aetatem conseduerunt , ubi lactare desiisset ” (Epid. L. II. p. 1013). Latinis Echthymata *pustulae* dicuntur , adeo ut incertum sit hujus , pro hodierna artis conditione , denominatio , nam forte pertineant ad *Ecthyma* WILLANI , an ad aliquam Lichenis speciem vel *Phlyzacion* ALIBERTI.

*ad pudenda* (79). — Cognita illi fuit *Herpes Labialis* vel *hydroa febrilis*, eruptio ad labia in febribus critica (80). — *Scarlatinam* HIPPOCRATI haud ignotam fuisse, ex interpretatione variorum locorum derivare conatus est READ (81). — Pariter multum disputatum est, num *pemphigus* HIPPOCRATI notus fuerit, imprimis a ROBERT (82), ne moneam alias eruptiones, quarum notio probabilibus quidem argumentis erui potest. *Pompholyx* vero intelligi videtur eruptione, quam HIPPOCRATES hisce verbis describit: *πομφοι ὡς ἀπο κνιδης* (83).

---

Ad *Eczemata* WILLANI forte referri potest locus in *L. de humorum usu* p. 426. de cutanea eruptione, quam nonnulli *αιθολικας* (in text. *θορηκας*) dicunt. Cf BATEMAN p. 370.

(79) *De nat. muliebri* l. p. 382.

(80) *De morb. epid.* L. V. p. 1201. n. 41.

(81) *Histoire de l'esquinancie gangréneuses pétéchiale qui a regné dans le Village du Moivron 1777.* p. 18. Pertinerent huc Sec. 17. aph. 37, 43; *de morb. Epid.* p. 1073.

(82) CORVISART *Journ, de méd.* 1812.

(83) *L. de morb.* II. p. 485; *L. de morb. mal.* II. p. 641. Cf. BATEMAN l. l. p. 225.

Restat, ut quaedam hisce subjungamus, de morbo sub ἐρπητες nomine apud HIPPOCRATEM obvio (84). Sub herpete intelligebantur varii morbi cutanei, imprimis in exulcerationem proni. Graecis duae erant species: ἐσθιομενος s. exedens et κερχουας, s. miliaris (quorum prior etiam a Medicinae patre describitur) priorem *Lupum*, alteram *herpetem miliarem* s. *phlyctenoidem* dicit RAYER, WILLAN et BATEMAN eosdem ad HERPETIS reducunt varias species. ALIBERT haec disserit de dermatosium familia herpetica, in germanam linguam traducta: Wirklich scheinen diese Arten von Ausschlägen seit einigen Jahrhunderten ungemein viel häufiger geworden zu seyn, wenn man aus dem Stillschweigen schliesst, dass die ersten Väter der Kunst in dieser Beziehung beobachten. Zu HIPPOCRATES Zeiten sah man sie für seltene und unerhörte Erscheinungen an; es erschienen damals wohl von Zeit zu Zeit einige leichte Ausschlagskrankheiten; aber diese Ausschläge waren gewissermassen eben nur das augenfällig-

---

(84) Aph. 23. Sect. V; *Lib. de Legend. usu.* 427; *Pragnost.* L. II. p. 98; *Coac. praenot.* p. 220; *Epidem.* L. II. p. 1024.



ste Symptom gewisser Epidemischer Fieber. Die menschliche Haut hat sich so nach in Folge unserer fortschreitenden Verderbniss verändert; die Makeln, welche sie schänden, sind einere der traurigen Folgen unserer ungeordneten Lebensweise; denn die Natur hat die Hülle des lebenden Körpers keinesweges darum mit so viel Geschick gewoben, damit sie Krankheiten zur Beute werde (85).

TANTUM.





# THESES.

---

## I.

*Neque HIPPOCRATI, neque CELSO, neque aliis medicis, saltem ante Arabum aetatem, scabies nota erat.*

## II.

*Concedere nequeo statuentibus: HIPPOCRATEM aliosque medicos Graecos variolas cognovisse.*

## III.

*Entozoa generatione sic dicta spontanea si-  
ve aequivoca in corpore humano oriri, sta-  
tuo.*

## IV.

*Haemorrhoidalis fluxus, Lithiasis et Arthritis  
ex uno eodemque fonte prodeunt.*

## THESES.

### V.

*Morbi contagiosi e matre in foetum trans-  
eunt.*

### VI.

*Foetus solo Amnii liquore non nutritur.*

### VII.

*Calor animalis non ab uno fonte oritur.*

### VIII.

*Contagium gonorrhœicum a syphilitico dif-  
fert.*

### IX.

*Perforationes intestinorum non immediate ver-  
mibus producuntur.*

### X.

*Auscultatio per stethoscopium non semper  
certum exhibet graviditatis signum.*

### XI.

*Gastro-hysterotomia vulgo optime per lineam  
albam perficitur.*

## THESES.

### XII.

*Mediam uteri partem cum carnea tela maxime convenire statuo.*

### XIII.

*Resectio sive trepanatio indicata est, si fractura processuum spinosorum cum impressione et paralyseos symptomatibus elevatorii ope restitui nequit.*

---











